



Nobivac® «Forcat»: ВЗГЛЯНИ НА ЗАЩИТУ ШИРЕ!

За последние двадцать лет с развитием ветеринарной медицины мелких домашних животных вакцинация кошек стало уделяться более пристальное внимание. Появился целый ряд препаратов, способных защитить их организм от наиболее распространенных инфекций. Однако большинство традиционных вакцин предупреждают заражение панлейкопенией, инфекционным ринотрахеитом, калицивирусной инфекцией и бешенством.

Несмотря на столь очевидные успехи ветеринарных специалистов, существует ряд инфекционных болезней, которые до недавнего времени было невозможно предупредить в связи с отсутствием соответствующих препаратов. Особенно остро вопрос профилактики стоял для питомников, поскольку именно в юном возрасте кошки наиболее восприимчивы к инфекциям. Риск заражения возрастает при неудовлетворительных условиях содержания и кормления, контакте с неиммунизированными животными и, конечно, групповом содержании.

Среди возбудителей этих заболеваний чрезвычайно опасной является

хламидийная инфекция, вызываемая *Chlamydomphila felis*. По данным ряда зарубежных и отечественных исследователей, ее наблюдают у 30% домашних кошек, чаще у молодых животных. Кроме того, в группу риска входят особи, содержащиеся скученно и/или участвующие в выставках. При хламидиозе у котят и взрослых животных наблюдают выделения из глаз и носа, а в тяжелых случаях — пневмонию. Немало-


важно, что патоген часто участвует в развитии ассоциативных заболеваний верхних дыхательных путей, например, вместе с вирусами. Это обуславливает тяжелые проявления развившейся патологии.

В настоящее время компания «Интервет интернейшнл Б.В.» (Нидерланды) представляет на российском рынке ветеринарных препаратов вакцину Nobivac® «Forcat» (рис. 1), которая защищает организм кошки от:

Таблица 1. Схемы иммунизации кошек с помощью вакцин Nobivac®

вариант 1		вариант 2	
возраст	вакцины Nobivac®	возраст	вакцины Nobivac®
8-9 недель	Forcat	8-9 недель	Forcat + Rabies
12 недель	Forcat + Rabies	12 недель	Forcat + Rabies
1 год (далее ежегодно)	Tricat + Rabies	1 год (далее ежегодно)	Forcat + Rabies

- панлейкопении;
- герпесвирусного ринотрахеита;
- калицивирусной инфекции;
- хламидиоза.

Включение нового компонента, предупреждающего в дальнейшем заражение хламидиозом, делает вакцину Nobivac® «Forcat» идеальной для первичной иммунизации котят и ревакцинации взрослых кошек (таблица 1). Особенно это актуально для животных, находящихся в условиях повышенного риска заражения. 

Материал предоставлен
ООО «Интервет»



ИССЛЕДОВАНИЯ • ЭФФЕКТИВНОСТЬ • ЧЕСТНОСТЬ

Рис. 1. Вакцина Nobivac® «Forcat»

